

Danmarks Apotekerforening


Analyse

8. maj 2013

Behandling af psykoser mest udbredt i yderområder

Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet i perioden fra 1996 til 2012. I perioden 1999-2012 er antallet af personer, der bruger medicin mod psykoser steget 13 procent. Hver 3. medicinbruger med psykoser tager også et eller flere midler mod angst og søvnbesvær. Det er bemærkelsesværdigt, fordi samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin fører til øget dødelighed, og anbefales ikke af Sundhedsstyrelsen. Det er oftest kvinder, der tager medicin mod psykoser. For personer under 40 år er der dog flest mænd, der tager antipsykotisk medicin. Forbruget stiger med alderen for både mænd og kvinder. Personer i yderområder tager i højere grad antipsykotisk medicin sammenlignet med personer i hovedstadsområdet.

Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet siden 1996. Det svarer til en stigning på omkring 4 procent om året i gennemsnit i perioden 1996-2012. Der blev i 2012 i alt brugt 26 millioner døgndoser antipsykotisk medicin. Antallet af personer i behandling med medicin mod psykoser er i perioden 1999-2012 steget med 13 procent eller fra 111.000 personer i 1999 til omkring 125.000 personer i 2012. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 1 procent.



Patienter med psykoser og deres øvrige medicinforbrug


Over halvdelen af de ca. 120.000 personer, der i løbet af et halvt år har indløst en recept på medicin mod psykoser tager også antidepressiv medicin. Omkring 40 procent af de personer, der tager medicin mod psykoser tager også hjerte- og karmedicin mens omkring 20 procent også tager medicin mod mavesår og medicin mod svage smerter.

Patienter i behandling med antipsykotisk medicin og deres øvrige medicinforbrug

	Antal patienter i behandling med antipsykotisk medicin, 1.000 personer	Andel ift. patienter i antipsykotisk behandling, pct.
Medicin mod psykoser	118	100
Øvrigt medicinforbrug:		
Andet medicin	87	74
Medicin mod depression	62	52
Medicin mod hjerte- og karsygdomme	47	40
Medicin mod mavesår	26	22
Medicin mod svage smerter	23	19
Medicin mod angst (N05B)	22	18
Medicin mod søvnbesvær (N05C)	21	18
Astmå-, allergi- og KOL-medicin	20	17
Diabetesmedicin	10	9
Medicin mod knogleskørhed	3	3


Kilde: Se faktaboks side 4.

Det mest bemærkelsesværdige er dog, at knap hver 5. patient, der tager medicin mod psykoser, også tager medicin mod angst, og at knap hver 5. patient, der tager medicin mod psykoser, også tager medicin mod søvnbesvær. Knap 6 procent af de patienter, der tager medicin mod psykoser, tager også både medicin mod angst og medicin mod søvnbesvær. Samlet set tager omkring 35.000 personer svarende til hver 3. medicinbruger med psykoser (30 pct.) et eller flere midler mod angst og søvnbesvær. Det er bemærkelsesværdigt fordi, det strider mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvoraf det fremgår, at samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin ikke anbefales på grund af øget dødelighed hos medicinbruger.



Kilde: Statens Serum Institut, www.medstat.dk


Det er særligt kvinder, der får ordineret antipsykotisk medicin. For hver 1000 kvinder bruger godt 24 medicin mod psykoser, mens det er knap 21 mænd for hver 1000 mænd. Lidt flere mænd end kvinder bruger medicin mod psykoser i de yngre aldersgrupper (personer under 40 år), mens langt flere kvinder bruger medicin mod psykoser i aldersgrupper, der er ældre end 40 år. Forskellen er størst blandt personer mellem 65 og 79 år, hvor omkring 50 procent flere kvinder end mænd er brugere af antipsykotisk medicin. Der er flest brugere af antipsykotisk medicin for personer over 80 år, hvor omkring 56 personer ud af hver 1000 personer er brugere af antipsykotisk medicin.



Kilde: Statens Serum Institut, www.medstat.dk

I Region Syddanmark bruger relativt flest borgere medicin mod psykoser. I forhold til landsgennemsnittet bruger 16 procent flere borgere medicin mod psykoser per 1.000 borgere i Region Syddanmark i 2012. I Region Sjælland bruger 10 procent flere personer medicin mod psykoser per 1000 borgere. I Region Hovedstaden bruger 10 procent færre borgere medicin mod psykoser per 1.000 borgere i 2012. Dog var der i 2011 i Københavns Kommune en overvægt på 10 procent flere brugere af antipsykotisk medicin i forhold til landsgennemsnittet.

Er der signifikant flere eller færre personer i behandling mod skizofreni mm. (i behandling med antipsykotisk medicin) i din kommune sammenlignet med hele landet?



Kilde: [Statens Serum Institut](#) (Personer i behandling per 1.000 indbyggere, køns og alderskorrigeret, 2011)

Faktaboks: Datagrundlag

Danmarks Apotekerforening har analyseret, hvor mange personer, der i perioden fra den 4. april til den 9. oktober 2012 har fået udleveret lægemidler efter recept inden for hver enkelt ATC-gruppe af lægemidler. Det er på den baggrund opgjort, hvor mange forskellige lægemidler (ATC-grupper) personerne har fået udleveret efter recept i løbet af en 6 måneders periode.

Datamaterialet er baseret på en stikprøve. I de resultater, der refereres ovenfor, er disse oplysninger opgjort på 5-års aldersintervaller for henholdsvis mænd og kvinder, hvorefter resultaterne er opregnet til landsplan på baggrund af helårsdata fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor. Ved inddelingen i aldersgrupper er anvendt den alder, patienten havde ved indløsning af den første recept i perioden.