

Det mener apotekerne om uhensigtsmæssig medicinering



Læge og apotek kan samarbejde lokalt om at stoppe uhensigtsmæssig medicinering. I det nye sundhedsvæsen skal apotekerne samarbejde med læger i lægedækningstruede områder om medicin-gennemgang og efter aftale med læger hjælpe patienter med udtrapning.

Ingen borgere skal have mere medicin end nødvendigt

Patienter med flere kroniske sygdomme behandles ofte med flere forskellige lægemidler samtidig. Det kaldes polyfarmaci. Indimellem ses det, at behandlinger, som kun var tiltænkt for en kortere periode, fortsætter, uden at der reelt er et behov. Nogle borgere får dermed uhensigtsmæssig medicin. De risikerer at opleve bivirkninger, ringere livskvalitet og unødige kontakter til sundhedsvæsenet. Uhensigtsmæssig medicinering bør stoppes, så risiko for både lægemiddelrelaterede problemer og medicinspild minimeres.

- 700.000 borgere tager mere end fem lægemidler. Risikoen for at opleve lægemiddelrelaterede problemer stiger, jo flere lægemidler man bruger.
- Der er store menneskelige gevinster og offentlige besparelser ved at stoppe uhensigtsmæssig medicinering.
- Internationale erfaringer viser besparelser i form af færre udgifter til hospitalsindlæggelser og lægebesøg, når patienter alene anvender den medicin, der er nødvendig.
- Det er vigtigt, at afmedicinering (pausering, dosisreduktion eller seponering) foregår i en tillidsfuld dialog mellem patienten og relevante sundhedspersoner.
- Det er den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers lægemiddelbehandling. Men skal vi til bunds i medicinproblemerne, kræver det samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet. For eksempel ved at farmaceuterne på apotekerne foretager en medicingennemgang, som lægen kan tage udgangspunkt i ved årskontroller med patienter.
- Forskning viser, at flere multisyge får fjernet overflødige lægemidler, når de får gennemgået deres medicin af en farmaceut.
- Personalet på apoteket kan også efter aftale med lægen hjælpe borgeren med at trappe ud af uhensigtsmæssig brug af medicin.

Baggrund

Medicinproblemer giver sundhedssektoren store og unødvendige udgifter. Desuden har det store menneskelige omkostninger i form af sygefravær, dårligere sundhed og forringet livskvalitet. Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen af disse kan forebygges.